AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE
12, rue Victor Hugo-86-POITIERS __ Tél: (49) 41.35.55 __

ABONNEMENT ANNUEL 25F

C. C. P. LIMOGES 4.752.22. W. Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES 12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN Nº 115 - Supplément nº 1

DLP 22-4-70 050215

POIRIER - POMMIER /

TAVELURES: Toutes régions y compris la Gâtine pour les vergers en forme basse.

En raison du réchauffement général intervenu, des pluies récentes et surtout du développement de la végétation,

et compte tenu de l'évolution des ascospores,

effectuer d'urgence un nouveau traitement anticryptogamique.

La pulvérisation sera appliquée sur tous les poiriers, même ceux en début de floraison et sur tous les pommiers ayant atteint ou dépassé le stade C 3 (ouverture des bourgeons).

NOTE: En ce qui concerne les tavelures, il est rappelé qu'après toute pluie ayant lessivé un traitement, celui-ci doit être renouvelé sans attendre un avis de la Station.

COLZA /

MELIGETHES :

De nombreux colzas, surtout dans les charentes, sont à un stade sensible aux attaques de cet insecte, Toutefois, jusqu'à présent la quantité de méligèthes observés en cultures est très faible.

En conséquence, surveiller les cultures et intervenir si la population de ce ravageur devient importante.

-:-:-:-:-:-:-

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles, R. HUDE - H. BOUE

Imprimerie de la Station Poitou-Charentes . Directeur-Géraut : 1, BOUYX

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

POIRIER /

TAVELURE

Il y a lieu de redouter des contaminations importantes avec le retour d'un temps plus doux et humide. En conséquence effectuer un traitement anticryptogamique sur tous les poiriers qui n'ont pas été récemment traités. Sur tous les arbres proches de la floraison traiter avant l'ouverture des fleurs.

POMMIER /

TAVELURE

Dans toutes les régions y compris les vergers en forme basse de la 'Gâtine", la plupart des variétés de pommiers ont atteint ou dépassé le stade C 3. Les risques de contaminations sont donc grands, pour les réduire ou les éviter procéder à l'application d'une bouillie anticryptogamique sur tous les arbres ayant atteint le stade sensible.

VIGNE /

BLACK-ROT

En complément de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1970, rendant obligatoire la lutte contre cette maladie dans le vignoble du Neuvillois, il y a lieu de prendre les mesures suivantes :

Le plus tôt possible et de toute manière avant le débourrement, ramasser et détruire ou enfouir toutes les grappes desséchées demeurant au sol ou sur les ceps. Cette opération a pour but de diminuer la quantité de germes du Black-Rot et par suite les risques de contamination lorsque les conditions climatiques deviendront favorables à la reprise de cette maladie.

COLZA /

CHARANCON DE LA TIGE

Le charançon a été jusqu'à présent peu actif il est encore susceptible de commettre des dégâts dans les cultures au stade de montaison.

Dans les secteurs où il y a eu des dommages l'an passé, surveiller les cultures qui seraient à un tel stade, et intervenir si nécessaire.

l'Inspecteur de la Protection des Végétaux, F. BARBOTIN Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles, R. HUDE - H. BOUE

